



पृती वारकेम वायोटेक प्रा. लि. मुंबई.

मि मनिरा शरद बोरोले रा. चिनावल, ता. शेवरे,
जि. जळगाव. मागील वर्षी मि कपाशी (Cotton) या
पिकावर हायकोलियर न्युट्रियंट चा वापर केला होता
तरी मला व्यापासुन चांगले उत्पन्न मिळाले. ते
वापरण्याची पध्दत माधी मि वेनेपूकीया केली व्यापासुन
त्या कपाशीची उगवणराखी वाढली व 30-35 दिवसा-
नंतर पडीला स्प्रे केला. त्यामुळे सांगाची वाढ उत्तम-
रित्या वाढली. व फुलपात्याची संख्या वाढली. नंतर
६० ते ६५ दिवसांनी दुसरी कवारणी (स्प्रे) केला.
त्यामुळे फुलगाळ थांबली व केरीच्या आकाराला
वाढ झाली. त्यामुळे मला सरासरी उत्पन्नाच्या
२० ते २५% जास्त उत्पन्न मिळाले. पाकीच्या
लाटवर मला १५ क्वीटल कापूस झाला तर
हायकोलीय हीटमेटच्या लाटवर मला १८ क्वीटल शुद्ध
कापूस झाला. तरी हायकोलियर हे कपाशी या
पिकावर मातशाय कायदेशीर आहे. तरी शेतकरी
बांधवांनी कपाशी (Cotton) या पिकावर हायकोलीयर
न्युट्रियंट वापरण्यास काही रक दरकत नाही

Mandale

मनिरा शरद बोरोले.

आपला शेतकरी मित्र