



पुली वारकेम् बायोटेक हा.लि.
मुंबई

मि. मोठन रामु चौधरी वा दसनुर, लो. कोवेर,

जि. जळगाव मि. मार्गील वर्षी मका पा पिकावर 'हायफोलिय
न्युट्रीयंट' वापर केला होता तरी मला व्यापासुन घांगले उत्पादन
मिळाले. मि. रब्बी मध्ये मका ३०७१२ पा वोणाचे मळुना कीत
७.५ एकर टोकन पद्धतीने अदमाशे ७० ते ७२ इंच या पृष्ठारे
केळीमध्ये दोन झोळी वा हुकार ठिक सिंचनाखाली लागवड केली
होती. व्यापेकी २.५ एकर क्षेत्रावर मि. 'हायफोलीय न्युट्रीयंट' चा
४० दिवसानंतर एक फवारणी केली. मला ह्या क्षेत्राचा
(यामुळे योग्यता योग्यता कापदा साला. तरी मला हायफोलीय
वापरलेला) कीहाल २० ते २५% जास्त उत्पादन मिळाले. मला
हायफोलियर वापरलेह्या. क्षेत्राल एकरी ५६ किंवद्दल उत्पादन मिळाले.
व न वापरलेह्या. क्षेत्राल (५ एकर) मला एकरी ४५ किंवद्दल
उत्पादन मिळालेले झोट. तरी हायफोलीयर हे मका पा पिकावर
अतिरिक्त तुभावशाळी शेवर आहे. तरी शेतकरी बोधवांनी
मका पा पिकावर हायफोलीयर न्युट्रीयंट्स वा वापर
करूनपास काहीएक ठस्कल नाही.

आपला शेतकरी मिता
मोठन रामु चौधरी.